

FLAVOSOL 300mg/ml, picături orale, soluție propolis brut

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să luați **Flavosol** cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 3 zile.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este **Flavosol** și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați **Flavosol**
3. Cum să utilizați **Flavosol**
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează **Flavosol**
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE FLAVOSOL ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Flavosol este un medicament obținut din propolis brut, având proprietăți antibacteriene și antivirale.

Flavosol se utilizează ca adjuvant în tratamentul rinofaringitelor acute și cronice, anginelor tonsilară și faringiană, rinitelor cronice, infecțiilor intestinale (colite, enterocolite).

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI FLAVOSOL

Nu utilizați Flavosol

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la propolis, la alte produse apicole sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului;
- dacă aveți insuficiență hepatică sau renală severă;
- la copiii cu vârsta sub 12 ani (datorită conținutului în etanol).

Aveți grijă deosebită când utilizați Flavosol

Nu sunt necesare.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Aveți în vedere conținutul în etanol atunci când **Flavosol** se administrează împreună cu alte medicamente, mai ales medicamente care deprimă sistemul nervos central.

Utilizarea Flavosol cu alimente și băuturi

Evitați contactul **Flavosol** cu apa, ceaiul, sucurile sau alte lichide, pentru a evita precipitarea acestuia.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu utilizați **Flavosol** dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Datorită conținutului în etanol, **Flavosol** vă poate influența capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informații importante privind unele componente ale Flavosol

Acest medicament conține etanol 700mg/ml. Poate fi dăunător persoanelor cu etilism.

Acest lucru trebuie avut în vedere la femeile gravide sau care alăptează, copii și grupuri cu risc crescut cum sunt pacienți cu boli hepatice sau epilepsie.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI FLAVOSOL

Medicamentul se administrează pe cale orală.

Adulți: doza recomandată este de 1-3 ml picături orale, soluție (30-90 picături) de 3 ori pe zi, timp de 10 zile.

Adolescenți (cu vârsta peste 12 ani): doza recomandată este de 0,5-1,5 ml picături orale, soluție (15-45 picături) de 3 ori pe zi, timp de 10 zile.

Agitați flaconul înainte de utilizare. Aplicați picăturile de **Flavosol** pe miez de pâine sau pe o cantitate de zahăr sau miere pentru a fi mai ușor de înghițit.

Trebuie să vă prezentați la medic dacă manifestările dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 3 zile.

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Flavosol

Nu utilizați mai mult decât doza recomandată în acest prospect. Dacă ați utilizat mai mult, adresați-vă medicului.

Dacă uitați să utilizați Flavosol

Dacă ați uitat să luați o doză, luați alta, imediat ce v-ați amintit. Totuși, dacă este timpul pentru următoarea doză, luați-o doar pe aceasta. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Flavosol

Dacă întrerupeți tratamentul prea devreme (înainte să obțineți o ameliorare a manifestărilor bolii), este posibil să nu obțineți efectul dorit.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, **Flavosol** poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvențe:

Foarte frecvente	care afectează mai mult de 1 pacient din 10
Frecvente	care afectează mai puțin de 1 din 10 pacienți
Mai puțin frecvente	care afectează mai puțin de 1 din 100 pacienți
Rare	care afectează mai puțin de 1 din 1000 pacienți
Foarte rare	care afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți
Cu frecvență necunoscută	care nu poate fi estimată din datele disponibile

Foarte rar, pot să apară reacții alergice, care dispar odată cu întreruperea tratamentului.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ FLAVOSOL

Nu utilizați **Flavosol** după data de expirare înscrisă pe etichetă după Expiră. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A se utiliza în maxim 28 zile după prima deschidere a flaconului.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere.

Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare.

Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

Ce conține Flavosol

- Substanța activă este propolisul brut. Un ml picături orale, soluție conține propolis brut 300mg.

- Celelalte componente sunt: etanol 96%, apă purificată.

Un ml picături orale, soluție (30 picături) conține 28 mg flavonoide (exprimate în crizină) și 1,5 mg acizi polifenolcarboxilici (exprimați în acid cafeic).

Cum arată Flavosol și conținutul ambalajului

Flavosol se prezintă sub formă de soluție limpede, de culoare brun-roșcat, cu miros aromat caracteristic și gust slab astringent.

Este disponibil în cutii cu un flacon din PEJD a 25 ml picături orale, soluție, prevăzut cu picurător din PEJD și o măsură dozatoare din polipropilenă a 5ml.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul

SC TIS Farmaceutic SA, Str. Industriilor nr. 16, Sector 3, București, România

Acest prospect a fost aprobat în octombrie 2009