

Prospect: Informații pentru utilizator

PLANTAGINOL sirop Extract lichid de pătlagină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Plantaginol sirop și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Plantaginol sirop
3. Cum să utilizați Plantaginol sirop
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Plantaginol sirop
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Plantaginol sirop și pentru ce se utilizează

PLANTAGINOL sirop este un medicament pe bază de plante, care conține extract lichid de pătlagină (*Plantago lanceolata*) ca substanță activă.

PLANTAGINOL sirop este utilizat în mod tradițional în tratamentul simptomatic al inflamațiilor căilor respiratorii superioare însoțite de tuse uscată.

PLANTAGINOL sirop este indicat la copii cu vârstă peste 6 ani, adolescenți și adulți.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Plantaginol sirop

Nu utilizați Plantaginol sirop:

- dacă sunteți alergic la extract lichid de pătlagină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).
- dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. Acest medicament conține zahăr.
- dacă pacientul este un copil cu vârsta sub 6 ani.

Atenționări și precauții

- dacă sunteți însărcinată sau alăptați;
- dacă aveți diabet.

Plantaginol sirop împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

PLANTAGINOL sirop nu este recomandat în timpul sarcinii și alăptării, deoarece nu sunt disponibile informații suficiente despre siguranța administrării la gravide și femei care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

PLANTAGINOL sirop nu are sau are o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Plantaginol sirop conține 2,86 g zahăr/doză (5 ml sirop). Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la fructoză, sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză sau insuficiență a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest medicament. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

Plantaginol sirop conține 3 vol% alcool (etanol), adică până la 150 mg/doză (5 ml sirop), echivalent cu 3 ml bere sau 1,5 ml vin/doză (5 ml sirop). Poate fi dăunător persoanelor cu etilism. Acest lucru trebuie avut în vedere la femeile gravide sau care alăptează, copii și grupuri cu risc crescut cum sunt pacienții cu boli hepatice sau epilepsie.

3. Cum să utilizați Plantaginol sirop

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

PLANTAGINOL sirop este destinat administrării orale.

Siropul este destinat pentru adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.

5 ml sirop (o lingură dozatoare mare) conțin 1,2 g extract lichid de pătlagină.

Modul de administrare:

- *Adulți și adolescenți: 10 ml sirop de 3 ori /zi*

- *Copii peste 6 ani: 5ml sirop de 3 ori/zi.*

Copii cu vârsta sub 6 ani

PLANTAGINOL sirop nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub 6 ani.

În cazul în care simptomele nu se ameliorează după 7 zile de tratament, pacienții trebuie să se adreseze medicului.

Dacă utilizați mai mult Plantaginol sirop decât trebuie

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Plantaginol sirop

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă ați uitat să vă aplicați o doză, luați alta, imediat ce v-ați amintit.

Dacă încetați să utilizați Plantaginol sirop

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Nu au fost raportate reacții adverse la tratamentul cu sirop de pătlagină.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să comunicați medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Plantaginol sirop

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină/umiditate.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Plantaginol sirop

- Substanța activă este extract lichid de pătlagină (*Plantago lanceolata*) (0,8-0,9:1).

100 ml sirop conțin 24 g extract lichid de pătlagină (*Plantago lanceolata*) (0,8-0,9:1).

5 ml sirop conțin: 1,2 g extract lichid de pătlagină (*Plantago lanceolata*) (0,8-0,9:1)

- Celelalte componente sunt: benzoat de sodiu, zahăr (sucroză), apă purificată.

Cum arată Plantaginol sirop și conținutul ambalajului

Se prezintă sub formă de soluție slab opalescentă, de culoare brun roșcat închis.

Este disponibil în cutie cu un flacon brun din polietilentereftalat, de capacitate 115 ml (conține 100 ml sirop), închis cu capac din polietilenă de înaltă densitate de culoare albă și sigiliu de etanșeizare din polietilenă de joasă densitate de culoare albă, flaconul este însoțit de o linguriță dozatoare dublă din polistiren (de 2,5 ml și 5 ml).

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

S.C.Tis Farmaceutic SA, Str. Industriilor nr. 16, sector 3, București, România

Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2016.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>